

# Nadużywanie substancji psychoaktywnych



## Acodin - co się dzieje po zażyciu dużych dawek:

Lek może wywoływać stany euforyczne, uczucie błogostanu, niecodzienne doznania zmysłowe i halucynacje. Często powoduje także pobudzenie ruchowe i gadatliwość. Dekstrometorfan zawarty w Acodinie nie działa zawsze tak samo. Może spowodować niepokój, silne stany lękowe i ataki paniki oraz zaburzenia równowagi i niezborność ruchową. Nierzadkie są przypadki tzw. bad trip - kiedy zamiast przyjemnych doznań amator wrażeń doświadcza silnego lęku, ma urojenia zagrożenia życia, uczucie wyobcowania, oderwania od własnego ciała i utraty tożsamości. Dekstrometorfan powoduje także uwalnianie histaminy w organizmie, więc po zażyciu można cierpieć z powodu silnego swędzenia skóry.

## **Nadużywanie substancji psychoaktywnych-c.d. :**

**Ostre zatrucie** ( przemijający stan po użyciu środka psychoaktywnego)

Ostre zatrucie kanabinolami- prowadzi do zaburzeń percepcji czasu i przestrzeni, do odczuwania lekkości ciała, nastroju beztroskiego lub euforycznego. Doznania zmysłowe, szczególnie wzrokowe i słuchowe są wyostrzone. Często występuje zawyżona samoocena, poczucie głębszego, pełniejszego zrozumienia rzeczywistości, wielomówność, napady śmiechu. Część osób reaguje na kanabinole sennością.

Czasem może prowadzić do rozwoju psychozy z omamami wzrokowymi i słuchowymi, urojeniami prześladowczymi.

Objawy to manifestuje się przez kilka godzin w formie

## **Nadużywanie substancji psychoaktywnych-c.d. :**

### **Ostre zatrucie-c.d. :**

#### Ostre zatrucie substancjami stymulującymi (amfetamina):

Występuje wzmożone samopoczucie, podniecenie psychoruchowe, niepokój, zaburzenia snu, czasami lęk.

Można zaobserwować rozszerzone źrenice, drżenia mięśniowe, podwyższoną temperaturę. Mogą pojawiać się zaburzenia psychotyczne, napady paniki, zachowania agresywne, znaczny niepokój psychoruchowy.

## **Nadużywanie substancji psychoaktywnych-c.d. :**

**Szkodliwe używanie substancji** (używanie substancji powoduje szkody zdrowotne):

### Szkodliwe używanie kanabinoli:

- Zespoły lękowe ( głównie lęk napadowy)
- Zespół amotywacyjny ( zmniejszenie aspiracji i dynamizmu życiowego, zawężenie kręgu znajomych i kręgu zainteresowań)

### Szkodliwe używanie substancji stymulujących (amfetamina)

## Nadużywanie substancji psychoaktywnych-c.d. :

**Zespół uzależnienia** ( silna potrzeba, „głód” narkotyku + występowanie tolerancji + zaniedbywanie zainteresowań, innych źródeł przyjemności z powodu przyjmowania substancji + zsp. Abstynencyjny + przyjmowanie substancji pomimo szkodliwych skutków)

Kanabinole- objawy uzależnienia somatycznego są słabo nasilone, brak zjawiska tolerancji

•zsp. Amotywacyjny

Amfetamina -W okresie używania może powodować zaburzenia nastroju, stany lękowe, urojenia prześladowcze i

## **Nadużywanie substancji psychoaktywnych-c.d. :**

### **Zespół abstynencyjny:**

Kanabinole (występuje tylko u przyjmujących długo duże dawki ) psychiczny głód kanabinoli, zaburzenia snu, drażliwość, lęk, zmniejszenie apetytu, wzmożona potliwość, czasami podwyższenie temperatury i dreszcze, trwa zwykle kilka dni.

Amfetamina- przez pierwsze 2-3 dni obserwuje się wzmożoną senność, obniżony nastrój, zmęczenie, potem te objawy mijają, a zwiększa się łaknienie.

**Dziękuję za uwagę!**